

# Comparaisons du suicide chez le personnel de la sécurité publique et la population générale, 2014 2018 : Résultats préliminaires

## \* Que savons-nous?

La nature du travail du personnel de la sécurité publique (PSP) les expose constamment à des situations potentiellement traumatiques sur le plan psychologique. Il existe des résultats contradictoires sur des taux de suicide plus élevés chez le PSP que dans la population générale.

Idées suicidaires  
27.8%\*

Plans suicidaires  
13.3%\*

Tentatives suicidaires  
4.6%\*

5 10 15 20 25 30

## Méthodologie

- Nous avons cerné les cas de suicide par un policier, un pompier, un paramédic ou un travailleur correctionnel entre 2014 et 2018 à partir de données de médias sociaux, de rubriques nécrologiques (journaux et sites Web) et d'organismes employeurs.
- Nous avons ensuite cerné pour chaque suicide du PSP le rapport correspondant auprès du coroner.
- Selon les données du coroner, chaque suicide du PSP peut être apparié à deux cas de suicide comparables au sein de la population générale.



Nous avons cerné un total de 31 cas de suicide du PSP entre 2014 et 2018, contre 62 cas dans la population générale.



Les femmes représentent seulement 3 % du PSP décédé par suicide, un chiffre significativement inférieur relativement à la population générale (25 %).



Le PSP était plus susceptible d'être divorcé ou séparé que la population générale.



Le PSP décédé par suicide comptait en moyenne 18 années de service. Il était plus susceptible d'avoir vécu un stress professionnel que la population générale.

4x


Le PSP était presque 4 fois plus susceptible de décéder par suicide au moyen d'une arme à feu. Une arme de service avait été utilisée dans 10 sur 11 décès par arme à feu.



Le PSP était plus susceptible d'avoir des symptômes de dépression et de trouble de stress post traumatique que la population générale.

## \* Résultats

Nous avons cerné un total de 31 suicides du PSP entre 2014 et 2018. Parmi eux, 71 % étaient des policiers, 13 % des pompiers, 13 % des paramédics et 3 % des travailleurs correctionnels. Nous les avons jumelés à 62 cas dans population générale.



Surveillez les résultats complets ici (en anglais seulement).

